



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แมลงค่อมทองลำไย

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเตือนการเฝ้าระวัง แมลงค่อมทองในลำไย ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำไยออกดอกติดผลอ่อนอาจมีการเข้าทำลายของแมลงปีกแข็งจำพวกแมลงค่อมทอง โดยมักเข้าทำลายกัดกินใบอ่อนและดอกลำไย ทำให้ต้นลำไยเสียหาย ชะงักการเจริญเติบโต มักพบการแพร่ระบาดของแมลงค่อมทองได้ง่ายช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม หลังจากนั้นจะพบเห็นแมลงค่อมทองน้อยลงในเดือนเมษายน และพบน้อยมากระหว่างฤดูฝน

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Hypomeces squamosus* Fab.

แมลงค่อมทอง จัดอยู่ในกลุ่มด้วงปีกแข็ง ตัวสีเหลืองถึงเขียวอ่อน มีปากกัดกินเป็นวงย่นเห็นได้ชัด ชอบอาศัยอยู่ใต้ใบเวลาถูกตัวหรือได้รับความกระเทือนจะทิ้งตัวลง ตัวแก่จะวางไข่ไว้ในดินเมื่อฟักและเจริญเป็นตัวหนอนจะอาศัยกินราก พืชอยู่ในดินและเป็นดักแด้อยู่ในดินจนกระทั่งเจริญเป็นตัวแก่ จะออกมากัดกินพืชและทำการผสมพันธุ์ต่อไป ระยะเป็นไข่กินเวลา ๑๐ - ๑๑ วัน ระยะหนอนอยู่ในดินนาน ๕ - ๖ เดือน ระยะเป็นดักแด้ ๑๔ - ๑๕ วัน

การทำลายผลผลิตลำไย

แมลงค่อมทองจะกัดกินใบอ่อนและดอกของลำไย ทำให้ต้นลำไยชะงักการเจริญเติบโต ดอกไม่เจริญศัตรูลำไยชนิดนี้พบมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม และจะลดน้อยลงไปเองตามธรรมชาติในช่วงเดือนเมษายน และพบน้อยที่สุดในช่วงฤดูฝน

วิธีการป้องกันกำจัด

แมลงค่อมทอง เริ่มจาก เขย่าต้นให้แมลงหล่นลงไปแล้วนำไปทำลาย โดยใช้ยาฆ่าแมลงพวกคาร์บาริล ในอัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คาร์บาเมท (แลนเนท) ในอัตรา ๑๐ - ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หากพบการแพร่ระบาดมาก แนะนำให้ใช้ยาไมโนโครโตฟอส ในอัตรา ๑๕ - ๒๐ ซีซี. ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร



รูปลักษณะของแมลงค่อมทอง