



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคแอนแทรกโนสในมะม่วง

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเตือนการระบาดของศัตรูพืช ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาว อาจมีการระบาดของโรคแอนแทรกโนส สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงช่วงติดดอกออกผล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เมื่อพบการระบาด ขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบและป้องกันกำจัดต่อไป

ลักษณะอาการ

- บนใบ จะเป็นจุดแผลสีน้ำตาลขยายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทั้งผิบนใบเหี่ยวแห้งบิดเบี้ยวเสียรูปทรง, ยอดอ่อนเหี่ยวและดำ
- บนก้าน ช่อดอกและก้านดอกเป็นจุดหรือขีดสีน้ำตาลแดงเล็กๆ ต่อมาจุดแผลขนาดใหญ่ และอาจทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล
- บนผล เป็นจุดสีดำรูปร่างกลม ขนาดไม่แน่นอน แผลขยายลุกลามทำให้เน่าทั้งผล

การป้องกัน

- ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย
- กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น
- ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
- หากพบว่าเริ่มมีการระบาด ให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิกรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร หรือแมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารเบนโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๕-๗ วัน โดยพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งสลับกันเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา



ลักษณะของโรคแอนแทรกโนส



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
เลขที่ ๔/๕ ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร ๐-๕๔๗๑-๐๒๔๖

