

เทคนิคการผลิตลำไยเงินล้าน

เจ้าขององค์ความรู้ นายสมรรถพล ขอดเตชะ

บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๓ ๑๓๒๖๓๔๔

การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค เกษตรกรจำเป็นต้องใส่ใจในกระบวนการผลิตลำไยครบทุกขั้นตอนและที่สำคัญเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ตามแผนปฏิบัติงานลำไยรายเดือน ถ้าเราทำได้ผมรับรองว่าลำไยท่านจะต้องมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน องค์ความรู้ที่ได้นี้ผมได้ถอดความรู้มาจาก นายสมรรถพล ขอดเตชะ ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๙ และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพลำไยบ้านพญาแก้ว โดยอิงหลักวิชาการ พอสรุปได้ดังนี้

การดูแลรักษาลำไย

การให้น้ำ ระยะออกดอกและดอกเริ่มบานควรเริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อดอกบานและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ระยะดอกบาน ระยะติดผลขนาดเล็ก เปลือก เมล็ดและเนื้อพัฒนา ระยะพัฒนาผล ระยะผลโตเต็มที่ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหากฝนไม่ตก ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตงดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว ๗-๑๐ วัน

การราดสารโปแตสเซียมคลอไรด์ ก่อนการราดสารต้องงดการให้น้ำ เพื่อให้ใบสะสมอาหารควรพ่นปุ๋ยเคมีสูตร ๐-๕๒-๓๔ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน จากนั้น ก็ทำการราดสารอัตรา ๘๐๐-๑๐๐๐ กรัมต่อตัน ต้องกวาดใบลำไยเข้าไว้ใต้โคนต้นก่อน ราดเสร็จก็ใช้ใบลำไยคลุมโคนต้นลำไยต่อเพื่อรักษาความชื้นให้แก่ต้นลำไย

การให้ปุ๋ย แบ่งเป็น ๕ ระยะ ดังนี้

-ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ๑๐-๒๐ กิโลกรัมต่อตัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ กับ ๔๖-๐-๐ สัดส่วน ๑:๑ อัตรา ๑-๒ กิโลกรัมต่อตัน

-ระยะใบแก่ พ่นปุ๋ยเคมีสูตร ๐-๕๒-๓๔ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน หากต้นไม่สมบูรณ์ พ่นปุ๋ยเคมีสูตร ๑๐-๕๒-๑๗ หรือ ๑๐-๔๒-๑๐ อัตรา ๓๐-๔๐ กรัม หรือ ๒๐-๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

-ระยะติดผลขนาดเล็ก เปลือก เมล็ดและเนื้อพัฒนา ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ผสม ๔๖-๐-๐ สัดส่วน ๑:๑ อัตรา ๑-๒ กิโลกรัมต่อตัน

-ระยะผลโตเต็มที่ ก่อนเก็บเกี่ยว ๓๐ วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๐-๐-๖๐ หรือ ๑๓-๑๓-๒๑ อัตรา ๑ กิโลกรัมต่อต้น

การป้องกันกำจัดโรค+แมลงลำไย

-ระยะออกดอกและดอกเริ่มบาน ควรเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลำไย เช่น หนอนกินดอก หนอนเจาะก้านดอก มวนลำไย เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง หากพบควรใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารเคมีกำจัดทันที ตามคำแนะนำ

-ระยะดอกบาน เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ พ่น อิมิดาโคลพริต อัตรา ๘ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑-๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน

-ระยะติดผลขนาดเล็ก เปลือก เมล็ดและเนื้อพัฒนา เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลำไย เช่น หนอนเจาะขั้วผล พ่นสารคาร์บาริล อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง พ่นน้ำมัน ปีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๖๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร กำจัดมดแดงที่เป็นพาหะเพลี้ย

-ระยะพัฒนาผล ป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งที่ซ่อนผล

-ระยะผลโตเต็มที่ เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลำไยผีเสื้อมวนหวานใช้เหยื่อพิษขุบสารคาร์บาริล เพลี้ยแป้ง ให้ตัดเผาทำลายหรือพ่นคาร์บาริล กำจัดมดที่เป็นพาหะ หากพบค้างคาว ควรใช้ตาข่ายในลอนกัน ดักจับ

-ระยะแตกใบอ่อน ๒ ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูลำไย เช่น ไรลำไย พ่นกำมะถันผง อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑-๒ ครั้ง ห่างกัน ๔ วัน แมลงค่อมทอง หนอนคืบ หนอนม้วนใบและหนอนบุงกินใบ ฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล อัตรา ๔๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หนอนเจาะกิ่ง ให้ตัดกิ่งเผาทำลาย และใช้คลอร์ไพริฟอส ๑-๒ มิลลิลิตร ฉีดเข้ารูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว โดยเน้นทรงเปิดกลางพุ่ม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี กำจัดกิ่งที่เป็นโรค

การปรับปรุงคุณภาพผล ราคารับซื้อลำไยสดของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับขนาดผลและสีผล เพื่อให้ได้ลำไยมีคุณภาพ เราต้องทำให้ต้นลำไยสมบูรณ์ก่อนการราดสารโปแตสเซียมคลอไรด์ โดยเน้นการพ่นแคลเซียมโบรอนผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชทุกครั้งตั้งแต่ระยะติดผลจนถึงระยะผลโตเต็มที่ ห่างกัน ๗-๑๐ วันครั้ง จะทำให้ผลลำไยสีเหลืองทองเป็นที่ต้องการของตลาด การเพิ่มขนาดผลควรตัดข้อผลลำไยให้เหลือแค่ ๖๐ ผลต่อข้อ

การรดน้ำก่อนออกดอก การรดการให้น้ำก่อนการออกดอกสำคัญมาก เพื่อให้ต้นลำไยสะสมคาร์โบไฮเดรตและหยุดการเจริญเติบโตของกิ่งใบและดอก เพราะตอนราดสารโปแตสเซียมคลอไรด์ รากลำไยจะดูดสารโปแตสเซียมคลอไรด์ได้อย่างเต็มที่เพราะขาดน้ำจึงต้องการน้ำพอดี ทำให้ลำไยออกดอกสม่ำเสมอ

การคลุมโคนต้น หลังตัดแต่งกิ่งลำไยเสร็จก็ใช้ใบลำไยคลุมดินใต้ต้นลำไย แล้วใช้จุลินทรีย์ย่อยที่เราหมักขยายเองสลายพ่นเพื่อช่วยเร่งการสลายใบลำไยให้กลายเป็นใบได้เร็วขึ้น





