

## การจัดการดูแลมะม่วงเขียวเสวย

### ๑ ช่วงข้างแรม ระยะ ๑ - ๗ ค่ำ

- ตัดแต่งกิ่งภายในเดือน สิงหาคม - กันยายน หลังแต่งกิ่งล้างต้นเพื่อกำจัดแมลง/โรคพืชและพ่นไทโอยูเรีย เพื่อตั้งยอด ๑ ครั้ง

### ๒ ช่วงข้างแรม ระยะ ๙ - ๑๔ ค่ำ

- ตัดแต่งกิ่งได้อีกไม่เกิน ๑๑ ค่ำ
- กำหนดให้ออกยอดใหม่โดยพ่นปุ๋ยตั้งยอด(ไทโอยูเรีย)
- ป้องกันแมลง
- ใส่ปุ๋ย สูตร ๑๕-๑๕-๑๕+ปุ๋ยอินทรีย์



### ๓ ช่วงข้างขึ้น ระยะ ๑ - ๗ ค่ำ เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน

- ป้องกันแมลงเจาะตอนแทงยอดใหม่
- ป้องกันแมลงปากอ้าตัดใบและแมลงเจาะก้านยอดใหม่
- ใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก สูตร ๘-๒๔-๒๔

### ๔ ช่วงข้างขึ้น ระยะ ๙ - ๑๔ ค่ำระหว่างเดือนตุลาคม

- พ่นฮอร์โมนสูตรผลไม้สุกหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร ๐-๕๒-๓๔ หรือ สูตร ๙-๑๙-๓๔ เพื่อเพิ่มสะสมตาดอก
- ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในช่วงนี้จะมีประโยชน์มาก

### ๕ ช่วงข้างแรม ระยะ ๙ - ๑๔ ค่ำระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน

- จัดการควั่นต้นหรือกิ่งแทนการลาดสารหรือลาดสาร
- พ่นปุ๋ยสูตร ๐-๕๒-๓๔ หรือฮอร์โมนสะสมตาดอกและจะช่วยระงับการแตกใบอ่อน

### ๖ ระยะแทงช่อดอกช่วงปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม

- ป้องกันแมลงเจาะตอนเริ่มออกดอก (ระยะเคยไก่อ)
- ป้องกันแมลงพ่นฮอร์โมนบำรุงช่อดอกแคลเซียมโบรอน
- ป้องกันโรคราพืชก่อนดอกบานและควรให้ทางใบสูตรบำรุงช่อดอกไปด้วย

### ๗ ระยะติดผล(เท่าหัวไม้ขีด)ช่วงเดือนปลายเดือนมกราคม – ต้นกุมภาพันธ์

- ป้องกันแมลงเพลี้ยจักจั่น,เพลี้ยไฟ,เพลี้ยแป้ง
- ฟ่นฮอร์โมนชีวเหนือยว ขยายผลจากน้ำหมักกรหมีถ้ามี
- ฟ่นปุ๋ยทางใบบำรุงผล สูตร ๒๑-๒๑-๒๑

### ๘ ระยะผลโต(เท่าตำมมิต)ช่วงเดือนมีนาคม

- ฟ่นปุ๋ยทางใบบำรุงผล สูตร ๒๔-๙-๑๙ + แคลเซียมโบรอน

### ๙ ระยะโตก่อนห่อ ช่วงเดือนเมษายน

- ฟ่นปุ๋ยทางใบบำรุงผล สูตร ๙-๑๙-๓๔ + แคลเซียมโบรอน + กันโรคราฟิช

### ๑๐ ระยะผลโตก่อนห่อ

- อาจมีการตัดแต่งกิ่งหรือควบคุมปริมาณกำจัดผลที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้มีคุณภาพ
- ทำการห่อผลในช่วงเดือนเมษายน สำหรับรุ่นแรก
- ฟ่นปุ๋ยทางใบบำรุงผลสูตรหนักตัวกลางและตัวท้ายหรือสูตรที่ทำให้ชีวเหนือยวขยายผลก่อนเก็บเกี่ยว



โดยนายวิชัย อินท่า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอกุญเพียง